

INFORMATION

ZUR BEHANDLUNG MIT POLYNUKLEOTIDE

Bitte **beachten Sie** folgende **Hinweise VOR** und **NACH** der Behandlung mit und informieren Sie uns rechtzeitig, sofern der Termin verlegt werden müsste.

VOR DER BEHANDLUNG

7 Tage vorher

- keine blutverdünnenden Medikamente (Aspirin, Ibuprofen, NSAR).
- keine Antibiotika oder Cortison Einnahme
- verzichten Sie weitestgehend auf intensive Sonneneinstrahlung oder Solariumbesuche.
- Keine aggressiven kosmetischen Behandlungen (Laser, Peelings, Mikrodermabrasion).

24 Stunden vorher

- Vermeiden Sie Alkohol und übermäßigen Nikotinkonsum.
- Keine intensive körperliche Anstrengung oder Sport.

Am Behandlungstag

- Kein Make-up oder Cremes auf die zu behandelnde Hautpartie auftragen.
- Die Haut sollte sauber und frei von Pflegeprodukten sein.

KONTRAINDIKATIONEN (eine Behandlung kann nicht erfolgen, beim Vorliegen von):

- o Schwangerschaft und Stillzeit
- o Minderjährigkeit (unter 18 Jahren)
- o Autoimmunerkrankungen
- o Gerinnungsstörungen oder Einnahme von Antikoagulanzen
- o Krebs oder Präkanzerosen
- o Akute Infektionen (viral, bakteriell oder pilzbedingt)
- o Allergien gegen Bestandteile des Präparats (z.B. Fischprodukte, Nukleotide, Konservierungsmittel)
- o Akute Hautinfektionen im Behandlungsbereich
- o Schwere Allgemeinerkrankungen oder immunsuppressive Zustände

Akute Infektionen

- Die Behandlung muss bei Infekten, Fieber, Erkältungen oder Hautinfektionen u. a. Herpes verschoben werden.

NACH DER BEHANDLUNG

Am Behandlungstag:

- Berühren Sie die behandelte Stelle nicht und vermeiden Sie es, Make-up / Cremes aufzutragen.

48 Stunden danach

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Solariumbesuche und körperliche Anstrengung.
- Kein Saunabesuch oder heiße Bäder.

Sonnenschutz

- Verwenden Sie (ab Folgetag) bei unvermeidbarer Sonneneinstrahlung einen Sonnenschutz mit LSF 50+

Nicht reiben oder massieren

- Vermeiden Sie das Reiben oder Massieren der behandelten Stellen

Kühlung

- Bei Schwellungen oder Rötungen können die behandelten Stellen leicht gekühlt werden.

Medikamente

- Vermeiden Sie blutverdünnende Medikamente und Alkohol für 1-2 Tage, um Blutergüsse zu reduzieren.